

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 85870160.0

51 Int. Cl.⁴: C 12 N 15/00

22 Date de dépôt: 19.11.85

30 Priorité: 23.11.84 BE 901119

43 Date de publication de la demande:
02.07.86 Bulletin 86/27

84 Etats contractants désignés:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

71 Demandeur: Région Wallonne représentée par l'Exécutif
Régional Wallon
11, Boulevard de l'Empereur
B-1000 Bruxelles(BE)

72 Inventeur: Jacobs, Paul
Chemin des Crolithes, 119
B-7806 Lanquesaint(BE)

72 Inventeur: Morals Gravador, Alfredo Jaime
Avenue des Cygnes, 21
B-1640 Rhode-st-Genese(BE)

72 Inventeur: Bollen, Alex
Gaasbeekstraat 65
B-1711 Itterbek(BE)

74 Mandataire: Blanchart, André
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction de
l'Energie et des Technologies Nouvelles Place Joséphine
Charlotte 3 (Boîtes 27-28)
B-5100 Jambes Namur(BE)

54 Procédé de préparation de plasmides vecteurs capables de transformer un hôte bactérien *Escherichia coli* et d'y promouvoir et contrôler l'expression d'un ADN hétérologue.

57 Procédé de préparation de plasmides vecteur capables de transformer la bactérie *E.coli* et d'y promouvoir et contrôler l'expression d'un ADN hétérologue caractérisé en ce que on transforme un promoteur. P_R en P_L , on invente une séquence leader optimisée pour la fixation du ribosome et l'initiation de la traduction, on invente une séquence chevauchant l'ATG d'initiation de la traduction portant une série de sites de restriction uniques permettant l'insertion et l'excision d'un ADN hétérologue, on vérifie que les plasmides portant un ADN hétérologue introduit en phase l'expériment efficacement dans une bactérie hôte appropriée.

Procédé de préparation de plasmides capables de transformer un hôte bactérien E.coli et d'y promouvoir et contrôler la synthèse d'un ADN hétérologue.

La présente invention se rapporte à la préparation de plasmides portant une séquence d'ADN choisie en vue de pouvoir y insérer et en extraire aisément une séquence d'ADN hétérologue de façon à ce que cette dernière soit exprimée dans la bactérie hôte Escherichia coli du plasmide. Elle concerne également les plasmides vecteurs obtenus selon les procédés revendiqués. Elle comprend plus particulièrement la conception d'une séquence nucléotidique représentant une partie du promoteur P_L du bactériophage lambda, une séquence représentant le leader de l'ARN messager transcrit à partir de ce promoteur, séquence choisie pour être optimale pour l'initiation de la traduction dudit ARN messager, enfin, une séquence de reconnaissance de différentes enzymes de restriction de façon à permettre l'insertion et l'excision d'ADN hétérologues en phase derrière le site d'initiation de la traduction.

L'expression d'ADN hétérologues en vue d'y diriger la synthèse de polypeptides dans la bactérie hôte Escherichia coli nécessite l'utilisation de plasmides appelés "vecteurs d'expression". De nombreux vecteurs d'expression ont été décrits dans la littérature. Ils ont tous en commun les caractéristiques de porter un promoteur, soit d'origine bactérienne, soit d'origine phagique, suivi d'un site de fixation des ribosomes et d'un site d'insertion d'un ADN hétérologue. L'ADN hétérologue à exprimer est introduit, soit avec son site propre d'initiation de la traduction, soit en phase derrière un site d'initiation de la traduction porté par le vecteur.

La présente invention a pour objet la préparation de plasmides capables de transformer des bactéries

E.coli, et portant un promoteur dont la séquence partiellement synthétique est celle d'un promoteur P_L du bactériophage lambda, transcrivant un messenger dont le leader a une séquence choisie pour être optimale pour l'initiation de la traduction et possédant une séquence, chevauchant le site d'initiation de la traduction, telle que l'on puisse la cliver par différentes enzymes de restriction.

Ce procédé de préparation de plasmides conçus pour permettre l'expression d'ADN hétérologues dans la bactérie E.coli selon la présente invention, est caractérisé en ce que le plasmide comprend :

a) un promoteur partiellement synthétique de séquence identique à celle du promoteur P_L du bactériophage lambda.

b) une séquence transcrite à partir du promoteur en question qui soit un leader considéré comme optimal pour l'expression d'un ADN hétérologue que l'on peut insérer en aval de ladite séquence leader.

c) une séquence de reconnaissance des enzymes de restriction KpnI, NcoI et BamHI à cheval sur le site d'initiation de la traduction.


De plus :

a) le promoteur de séquence identique à celle du promoteur P_L du bactériophage lambda est construit à partir d'un promoteur P_R dont la partie comprise entre le site HindII situé dans la région -35 et le site d'initiation de la transcription est remplacée par un fragment synthétique de séquence identique à la séquence naturelle du P_L .

b) la séquence leader transcrite à partir du promoteur en question est longue de 23 bases suivies d'un codon ATG d'initiation de la traduction, elle comprend un site de liaison des ribosomes homologue à l'ARN 16S du ribosome sur 9 bases et situé 12 bases en amont de

l'ATG.

c) les séquences reconnues par les enzymes KpnI, NcoI et BamHI sont combinées en une séquence de longueur minimum qui est :



De plus :

10 a) le promoteur P_L et le leader transcrit à partir de ce promoteur sont construits à partir du promoteur P_R du plasmide vecteur pCQV2 par remplacement d'un fragment HindII-BamHI de 56 paires de bases par un frgment de 60 paires de bases synthétisé sous forme de 4 oligodésoxyribonucléotides.

15 b) des bactéries hôtes E.coli sont transformées par le plasmide obtenu sous a), sélectionnées, et isolées par crible caractéristique, et les vecteurs portés sont caractérisés par séquençage des régions relevantes.

Enfin, la séquence leader inventée est la suivante :

20 A T G T A C T A A G G A G G T T T G G T A C C A T G

↑ initiation de la transcription	↑ initiation de la traduction
--	-------------------------------------

25 Le procédé faisant l'objet de la présente invention est plus particulièrement caractérisé par le choix des moyens suivants :

30 a) on conçoit de modifier le vecteur pCQV2 d'usage libre de façon à ce que le promoteur P_R qu'il porte devienne un promoteur P_L en utilisant le fait qu'il existe au sein de la région d'homologie -35 de ces deux promoteurs, un site de restriction HindII et que la région la plus éloignée du site d'initiation de la transcription par rapport au clivage HindII est identique pour les deux promoteurs.

- b) on conçoit une séquence optimale pour l'initiation de la traduction en prenant celle dont la complémentarité avec l'ARN 16S du ribosome est la plus grande dans les limites de la dimension permise de cette séquence et en faisant suivre cette séquence de 12 bases puis d'un ATG, codon d'initiation de la traduction. La distance de 12 bases entre le site de fixation du ribosome et le site d'initiation de la traduction étant considérée comme optimale.
- 5 c) on découpe la séquence ainsi conçue en 4 fragments monobrans convenables pour être synthétisés chimiquement et être clonés en deux étapes distinctes permettant un contrôle intermédiaire du bon fonctionnement du vecteur.
- 10 d) on synthétise chimiquement les 4 fragments dont l'ensemble couvre la partie du promoteur P_L comprise entre le site HindII de la région d'homologie -35 et le site d'initiation de la transcription ainsi que le leader de l'ARN messager et la région portant les sites
- 15 d'insertion choisis.
- 20 e) on insère les 4 fragments synthétiques dans le plasmide pCQV2 clivé par les enzymes HindII et BamHI et débarrassé du fragment HindII et BamHI de 56 paires de bases à remplacer.
- 25 f) on transforme des bactéries de la souche MM294 par l'ADN hybride obtenu dans la phase précédente.
- g) on sélectionne, par leur résistance à un antibiotique, les bactéries qui portent un plasmide.
- h) on isole de cette banque les clones porteurs de
- 30 l'ADN inséré par hybridation avec un fragment constitutif de l'ADN inséré marqué au ^{32}P .
- i) on caractérise le vecteur par séquençage des régions relevantes par la méthode de Maxam & Gilbert, à partir d'un site de restriction proche de l'ADN inséré dans le
- 35 plasmide. On obtient alors un premier vecteur.

j) on mesure le caractère fonctionnel du plasmide en insérant en phase derrière l'ATG un ADN hétérologue et en mesurant au moyen d'un test ELISA le taux de synthèse de la protéine codée par l'ADN hétérologue.

5 Suivant une variante du procédé faisant l'objet de la présente invention,

a) on délète le vecteur obtenu d'un fragment HindIII-HindIII de 125 paires de bases situées dans le gène *ci* codant pour le répresseur des promoteurs P_R et P_L .

10 b) on transforme, on sélectionne et on caractérise le résultat comme décrit plus haut de f) à j). On obtient alors un second vecteur ; ce vecteur ne portant plus de répresseur de son propre promoteur devra être utilisé dans une souche lysogène pour un bactériophage λ déficient porteur du gène *ci*, soit sous sa forme sauvage, soit sous forme d'un mutant thermosensible *ci_{ts}*).

Suivant une autre variante du procédé,

20 a) on insère deux fragments synthétiques complémentaires de 34 bases dans le vecteur obtenu clivé par les enzymes BamHI et PvuII débarrassé du fragment BamHI-PvuII de 1692 paires de bases. La séquence de 34 paires de bases est choisie de façon à
25 présenter un maximum de sites de restriction qui par ailleurs ne se retrouvent pas en une autre localisation dans le vecteur. Elle porte notamment les sites SacII, BalI, SalI, XhoI, SacI et PvuII, et est la suivante :

30

	BamHI	SacII	BalI	
	G A T C C C C G C G G T G G C C A			
	SalI	XhoI	SacI	PvuII
	G T C G A C C T C G A G C T C A G			

b) on transforme, on sélectionne et on caractérise le

résultat comme décrit plus haut de f) à j)). On obtient alors un troisième vecteur.

Le procédé de préparation de plasmides d'expression d'ADN hétérologue dans la bactérie E.coli est caractérisé par la combinaison et le choix d'un ensemble de moyens détaillés ci-après.

La construction d'un vecteur d'expression performant peut être faite par exemple en modifiant un vecteur d'expression banal, par exemple pCQV2 décrit par Queen (Mol. Appl. Genet., 2(1983)1-10), en vue d'optimiser les différents éléments influant sur son efficacité. Ces éléments sont principalement le taux de transcription dépendant de la séquence du promoteur et plus particulièrement des régions -35 et -10; ainsi que l'efficacité de l'initiation de la traduction déterminée par la séquence du site de liaison du ribosome et la séquence et la distance entre celui-ci et l'ATG d'initiation. On trouvera dans Rosenberg et Court (Annual Rev.of Genet. 13 1979, pp.319-354) une comparaison de différentes séquences promotrices bactériennes et de bactériophages; dans Kastelein, R.A., Berkhout, B., Overbeek, G.P. et Van Duin, J. (Gene 23 (1983) 245-254), Joy, E., Seth, A.K., Romens, J., Sood, A. and Joy, G. (Nucleic Acids Res. 10(1982) 6319-6329), Gheysen, D., Iserentout, D., Derom, C. and Fiers, W. (Gene 17 (1982) 55-63), Joy, G., Khoury, G., Seth, A.K. and Joy, E. (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78 (1981) 5543-5548), Hui, A., Hoyplick, J., Dinkelspiel, K. and de Boer, H.A. (The EMBO J. 3 (1984) 623-629), l'état des connaissances quant aux facteurs influençant l'initiation de la traduction chez E.coli.

On peut concevoir une séquence qui paraisse optimale au vu des différents critères tels qu'ils ressortent de la littérature citée; par exemple:

- a) la séquence promotrice sera celle du promoteur P_L du bactériophage lambda ;
- b) le site de reconnaissance du ribosome sera complémentaire de l'ARN 16S du ribosome sur 9 bases et la distance entre ce site et l'ATG d'initiation sera d'environ 10 paires de bases. En aval de l'ATG d'initiation, on peut concevoir une séquence telle que un maximum de sites de restriction apparaissent sur une distance minimale et que ces sites soient uniques dans le vecteur. Cette séquence peut par exemple être conçue pour commencer par l'extrémité cohésive d'un site BamHI et se terminer par une extrémité franche.
- c) on peut créer une telle séquence, par exemple en la découpant en fragments simple brin de façon optimale, compte tenu des possibilités de la synthèse chimique d'ADN que l'on peut trouver décrite dans Narang, S.A. (Tetrahedron 39 (1983) 3-22), et de façon à pouvoir réaliser le clonage de ces fragments en deux étapes, un premier groupe de 4 fragments se terminant par exemple par un site BamHI, les deux derniers fragments ayant un site BamHI à leur extrémité 5' sur la fibre codante et une site PvuII à leur extrémité 3' sur la même fibre.
- d) la synthèse chimique des fragments d'ADN voulus peut se faire selon différentes méthodes dont on trouvera la description dans Narang, S.A. (Tetrahedron 39 (1983) 3-22), Itakura, K. (Trends in Biochem.Sc. (1982) 442-445), Ohnaka, E., Ikehara, M. and Soll, D. (Nucleic Acids Res. 10 (1982) 6553-6570). A titre d'exemple, on peut utiliser soit la méthode des phosphotriesters décrite par Brown, E.L., Belagage, R., Ryan, M.J. and Khorama, M.G. (Methods in Enzymology 68 (1979) 109), soit celle des phosphites triesters décrite par Letsinger, R.L. and Lusford, W.B. (J. Am. Chem. Soc. 98 (1976) 3655). Ces méthodes diffèrent

par le degré d'oxydation de l'atome de phosphore dans les intermédiaires nucléotidiques mis en oeuvre lors de la réaction de couplage.

- e) L'hybridation et la ligation des fragments d'ADN synthétique entre eux peut se faire par différentes méthodes dont on trouvera la description dans Molecular Cloning (1982 - Maniatis, T., Fritsch, E.F. and Sambrook, J., CSH Publ.). Ces méthodes sont basées sur le principe de l'hybridation des séquences complémentaires d'ADN. Elles consistent à mélanger les fragments d'ADN dans des conditions de température et de force ionique adéquates à la formation des hybrides spécifiques. La ligation de ces fragments hybridés est le résultat de l'action d'une enzyme, par exemple la T4 DNA ligase. La formation in vitro de molécules hybrides entre l'ADN synthétique double brin à cloner et l'ADN de vecteurs plasmides s'effectue selon le procédé décrit dans Molecular Cloning (1982 - Maniatis, T., Fritsch, E.F. and Sambrook, J., CSH Publ.), qui consiste à mélanger les molécules dans des conditions de température et de force ionique appropriées. C'est ce protocole qui a été suivi dans la réalisation de l'invention. L'ADN vecteur employé dans la réaction de recircularisation in vitro peut provenir de différents plasmides. Dans la réalisation de cette invention, on choisit de préférence le plasmide pCQV2 (Queen, C., J. Mol. Applied Genet. 2 (1983) 1-10) dans lequel on clone entre les sites HindII et BamHI d'une part, et BamHI et PvuII d'autre part.
- f) La plupart des méthodes utilisées pour transformer des bactéries par de l'ADN exogène font appel à un traitement particulier des bactéries par du chlorure de calcium, et visent à optimiser l'efficacité de transformation pour différentes souches de bactéries.
- Dans le cadre de l'invention, plusieurs types de

bactéries peuvent servir d'hôtes aux vecteurs utilisés. On prendra de préférence la souche d'Escherichia coli MM294 pour les vecteurs portant leur propre répresseur, et N99 et N5151 pour les vecteurs dépourvus de leur propre répresseur. Leurs conditions de croissance sont particulièrement commodes. En outre, parmi les différents procédés de transformation, on choisit celui décrit dans Mandel, M. and Higa, A. (J. Mol. Biol. 53 (1970) 154).

5 g) En raison des marqueurs de résistance aux antibiotiques présents dans l'ADN du vecteur, il est simple d'isoler les bactéries transformées par l'ADN recombiné in vitro. Par exemple, si l'ADN du vecteur porte le gène Tet^R, toute bactérie portant un tel vecteur sera résistante à la tétracycline. En outre, si l'insertion de l'ADN dans le vecteur a pour effet d'inactiver un gène de résistance à un antibiotique, on repérera les bactéries qui portent le vecteur recombinant par leur sensibilité à cet antibiotique. De préférence on choisit comme marqueur de sélection le caractère Amp^R des plasmides construits.

10 h) Le crible de sélection des clones porteurs de l'ADN-synthétique peut se faire selon des méthodes mettant en oeuvre une sonde synthétique. Cette approche est détaillée dans Genetic Engineering, vol.1, Williamson, R. Ed., (1981) Academic Press, N.Y. Dans le cadre de la présente invention, on utilise de préférence l'un ou plusieurs des fragments constitutifs de l'ADN-synthétique marqué au ³²P comme sonde oligodésoxyribonucléotidique que l'on hybride avec les clones de la banque.

15 i) La séquence d'ADN créée dans l'un ou plusieurs des clones obtenus peut être caractérisée par des méthodes de séquençage décrites dans Maxam, A. & Gilbert, W. (Methods in Enzymology 65 (1980) 497-559) et dans

Sanger, F., Nicklen, S. & Coulson, A.R. (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74 (1977) 5463). Dans le cadre de la présente invention, on choisira de préférence la méthode de Maxam & Gilbert.

- 5 j) On peut alors tester la valeur des plasmides créés, par exemple en y insérant un ADN hétérologue dont l'expression peut être mesurée par exemple par un test ELISA comme décrit dans Bollen, A., Herzog, A., Cravador, A., Hérion, P., Chuchana, P., van der
10 Straten, A., Loriau, R., Jacobs, P. & Van Elsen, A. (DNA 2 (1983) 255-264).

L'exemple non limitatif suivant qui s'applique à la construction de vecteurs d'expression à partir du plasmide pCQV2 permettra de mieux comprendre
15 l'invention.

A. Construction du plasmide vecteur désigné ci-après par pULB1219 et obtenu suivant les revendications 1 à 4.

- 20 1. Modification du promoteur P_R du vecteur pCQV2 en promoteur P_L et optimisation des séquences influençant l'initiation de la traduction.

Dans le cadre de la présente invention, nous avons choisi de modifier le promoteur P_R du vecteur pCQV2 pour en faire un promoteur P_L. Pour cela, nous avons
25 inventé la séquence double brin suivante.

```

      1           10           20
5' G A C A T A A A T A C C A C T G G C G G T G A T A C T
3' C T G T A T T T A T G G T G A C C G C C A C T A T G A
      60           50           40

```

```

30           30           40           50
G A G C A C A G C A G C T A A G G A G G T T T T G G T
C T C G T G T A G T C G A T T C C T C C A A A A C C A
      30           20

```

60

A C C A T G 3'
 T G G T A C C T A G 5'
 10 1

- 5 Cette séquence est caractérisée en ce que :
- a) son extrémité 5' (considérant la fibre identique au mRNA) est franche et correspond à la coupure par l'enzyme HindII dans la région -35 homologue aux promoteurs P_R et P_L , en ce qu'elle est identique à
- 10 la séquence naturelle du P_L jusqu'au site d'initiation de la transcription (base 34 sur la fibre codante),
- b) les 26 bases suivantes sont choisies pour constituer un site de reconnaissance par les ribosomes qui soit
- 15 optimal, pour que la séquence et la distance séparant ce site de reconnaissance du site d'initiation de la traduction (ATG, bases 58, 59, 60) soit optimale, et pour présenter devant cet ATG les sites de reconnaissances des enzymes KpnI et NcoI,
- 20 c) son extrémité 3' se termine par la partie d'un site de restriction BamHI telle qu'elle apparait après clivage d'un ADN par cette enzyme.
- Dans le cadre de la présente invention, nous avons choisi de synthétiser cette séquence sous forme de 4
- 25 fragments simple brin allant des bases 1 à 27 et 28 à 60 sur la fibre codante et 1 à 30 et 31 à 64 sur la fibre complémentaire.
2. Préparation et ligation des fragments constitutifs
- Dans le cadre de la présente invention, on choisira de
- 30 préférence de digérer le plasmide pCQV2 par les enzymes BamHI et HindII et d'isoler par électrophorèse sur gel d'acrylamide et électroélution les fragments obtenus de 4302, 459 et 125 paires de bases. On choisira ensuite de digérer le fragment de 459 paires

de bases par l'enzyme HindIII ce qui génère 2 fragments de 403 et 56 paires de bases qui sont séparés par électrophorèse; le fragment de 403 paires de bases est électroélué.

- 5 Par ailleurs on choisit de ne phosphoryler que les fragments de 33 et 34 bases de façon à éviter la formation de polymères lors de la ligation. On mélange alors 50 pmoles de chacun des 4 fragments synthétiques; le mélange est porté 2' à 90°C et refroidi
10 lentement jusque 15°C, on ajoute 10% en volume d'acétate de sodium 3M et 2,5 vol. d'éthanol, on refroidit 20' à -80°C et on centrifuge. Le culot est lavé à l'éthanol 75% dans l'eau, séché et resuspendu en tampon de ligation (50mM Tris HCl pH7.4,
15 10mM MgCl₂, 10mM DTT, 1mM spermidine, 1mM ATP; 0,1 mg/ml BSA). Les trois fragments de pCQV2 de taille 4302, 403 et 125 également en solution en tampon de ligation, sont ajoutés à raison de 40 pmoles de chaque. Le mélange est incubé 16h à 15°C en présence de 5
20 unités de l'enzyme T4 DNA ligase.

3. Transformation des bactéries hôtes MM294

- On procède alors à la transformation de la souche MM294 ("Molecular Cloning", Maniatis, J., Fritsch, E.F., Sambrook, J., CSH Ed. 1982) dont le système de
25 restriction est modifié de façon à tolérer la présence d'un ADN étranger selon la méthode décrite dans "Molecular Cloning" (Maniatis, J., Fritsch, E.F. and Sambrook, J., CSH Ed. 1982).

4. Obtention de la banque de clones

- 30 En raison du caractère Amp^r du plasmide, on peut sélectionner les bactéries transformées par simple croissance sur milieu contenant de l'ampicilline. L'ensemble des manipulations décrites ci-dessus a conduit à l'obtention d'une banque de 100 clones dont
35 une grande partie doit contenir un plasmide de séquence

voulue.

5. Isolement des clones de séquence voulue

On a recherché les clones porteurs d'un plasmide ayant la séquence voulue au moyen du fragment de 34 bases utilisé comme sonde. Après avoir marqué cette sonde au ^{32}P par une réaction enzymatique (kination en 5' de la sonde), nous l'avons utilisée pour cribler la banque de clones. Pratiquement, on fixe l'ADN de chaque clone sur feuille de nitrocellulose, suivant la technique de Grunstein, M. et Hogness, D. (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 78 (1975) 3961) et on l'hybride avec la sonde synthétique marquée au ^{32}P dans des conditions ioniques et de température appropriées (0,9 NaCl et 55°C), la sonde radioactive va reconnaître spécifiquement l'ADN des clones portant une séquence homologue, c'est-à-dire une séquence nucléotidique typique du promoteur P_L . On visualise les clones positifs par autoradiographie. Les clones positifs sont alors analysés par restriction par les enzymes HindII, BamHI, NcoI, KpnI, HindIII; à cette étape, un clone ayant toutes les propriétés voulues a été retenu, pULB1219.

6. Séquencage du clone pULB1219

On caractérise le plasmide du clone pULB1219 par l'établissement de la séquence nucléotidique de la région modifiée et des jonctions avec les régions non modifiées. A cet effet, l'ADN du plasmide recombinant est préparé et clivé au site de restriction BamHI unique dans le plasmide recombinant. Les extrémités du plasmide linéarisé sont alors marquées au ^{32}P . On coupe ensuite le plasmide par l'enzyme EcoRI générant deux fragments dont l'un porte à son extrémité marquée la séquence synthétique. Le fragment marqué est alors soumis à une série de réactions chimiques conduisant à la production d'oligonucléotides marqués, de tailles

différentes, dont l'analyse sur gel de polyacrylamide conduit à l'établissement de la séquence en bases suivant la technique de Maxam, A.M. & Gilbert, N. (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74 (1977) 560). On voit que la

5 séquence obtenue est parfaitement conforme à celle définie en 1., et jointe aux fragments de pCQV2 de la façon choisie.

B. Construction du plasmide vecteur désigné ci-après par pULB1220 et obtenu suivant la revendication 5.

10 1. L'ADN du plasmide pULB1219 est clivé par l'enzyme de restriction HindIII générant deux fragments. Ceux-ci sont séparés sur gel de polyacrylamide et le plus grand est électroélué.

2. Ce fragment est alors reliqué sur lui-même générant

15 le plasmide vecteur pULB1220.

3. Le plasmide vecteur pULB1220 est utilisé pour transformer la souche de E.coli N99 lysogène pour un λ défectif portant le gène cI sauvage. Ceci conduit à l'obtention d'une banque de clones caractérisés par

20 simple restriction.

C. Construction du plasmide vecteur désigné ci-après par pULB1221 et obtenu suivant les revendications 6 à 8.

1. Conception d'une séquence d'insertion/excision d'ADN hétérologue

25 On choisit, pour l'insérer entre les sites BamHI et PvuII du fragment obtenu, la séquence suivante.

```

      1              10
5' G A T C C C C G C G G T G G C C A
      3' G G G C G C C A C C G G T
30              20
      20              30
G T C G A C C T C G A G C T C A G 3'
C A G C T G G A G C T C G A G T C 5'
      10              1

```

présentant notamment les sites de restriction SacII, BalI, AccI, SalI, AvaI, XhoI, HgiAI, SacI. De plus, l'insertion de cette séquence dans pULB1220 régénère les sites BamHI et PvuII.

5 2. L'ADN du plasmide vecteur pULB1220 est clivé par les enzymes de restriction BamHI et PvuII. Cette digestion génère deux fragments, qui sont séparés sur gel de polyacrylamide. Le plus grand est purifié par électroélution.

10 3. La séquence choisie est synthétisée sous forme de 2 fragments monobrins complémentaires comme décrit plus haut.

4. Les 2 fragments monobrins sont hybridés et ligués comme décrit plus haut.

15 5. Le plasmide vecteur obtenu est utilisé pour transformer la souche N99 comme décrit.

6. La banque de clones obtenue est caractérisée par hybridation avec le fragment de 34 bases utilisé comme sonde, comme décrit. Les clones positifs sont alors
20 testés pour la présence des sites de restriction portés par le fragment synthétique. Le clone pULB1221 est retenu.

7. L'ADN du plasmide vecteur pULB1221 est isolé et clivé par l'enzyme NcoI. Le plasmide linéarisé est
25 marqué au ^{32}P comme décrit, recoupé par l'enzyme EcoRI et séquencé comme décrit. La séquence est exactement celle choisie.


D. Test de l'efficacité des plasmides vecteurs pULB1219, pULB1220 et pULB1221.

30 1. Afin de tester l'efficacité des plasmides vecteurs pULB1219, pULB1220 et pULB1221, un cDNA codant pour l' α_1 -antitrypsine humaine (α -AT) a été inséré en phase au site BamHI de chacun d'eux ainsi qu'au site BamHI du plasmide vecteur pCQV2 ; pour cela, un
35 fragment de cDNA de l' α_1 -AT portant un site

BamHI à son extrémité NH₂ terminale et une extrémité franche après le stop, a été ligué comme décrit, avec les plasmides pCQV2, pULB1219, pULB1220, clivés par BamHI et PvuII, et pULB1221 clivé par BamHI et BalI. Les plasmides recombinants obtenus ont été utilisés pour transformer les souches MM294 dans les cas de pCQV2 et pULB1219, et N99 dans les cas de pULB1220 et pULB1221. Les transformants ont été caractérisés par extraction à petite échelle de leur ADN plasmidique et restrictions appropriées. Dans le cas des plasmides pULB1220 et pULB1221, l'ADN plasmidique de clones jugés corrects est utilisé pour retransformer la souche N5151 lysogène pour un λ défectif porteur d'un gène *ci* muté thermosensible (*ci₁₅₇*). Les souches ainsi construites, pCQV2 α_1 -AT dans MM294, pULB1219 α_1 -AT dans MM294, pULB1220 α_1 -AT dans N5151 et pULB1221 α_1 -AT dans N5151, sont alors cultivées à 32°C jusqu'à une densité optique de 0,5 à 660 nm. La culture est alors divisée en deux parts dont l'une reste à 32°C et l'autre est portée rapidement à 42°C. Après 1h30, les cellules sont récoltées par centrifugation puis extraites au lysozyme et Triton X100. L' α_1 -antitrypsine et les protéines totales sont alors mesurées, la première par un test ELISA au moyen d'anticorps de chèvre et d'anticorps de souris couplés à la peroxydase, tous deux dressés contre l' α_1 -antitrypsine humaine, les secondes par la méthode du folin. Le résultat montre que les vecteurs pULB1219, pULB1220 et pULB1221 sont 5 à 10 fois supérieurs au parent pCQV2.

REVENDECATIONS

1. Procédé de préparation de plasmides vecteurs capables de transformer un hôte bactérien Escherichia coli et d'y promouvoir et contrôler l'expression d'un ADN hétérologue, caractérisé en ce que le plasmide comprend:
 - a) un promoteur partiellement synthétique de séquence identique à celle du promoteur P_L du bactériophage lambda.
 - 10 b) une séquence transcrite à partir du promoteur en question qui soit un leader considéré comme optimal pour l'expression d'un ADN hétérologue que l'on peut insérer en aval de ladite séquence leader.
 - 15 c) une séquence de reconnaissance des enzymes de restriction KpnI, NcoI et BamHI à cheval sur le site d'initiation de la traduction.
2. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon la revendication 1, caractérisé en ce que
 - 20 a) le promoteur de séquence identique à celle du promoteur P_L du bactériophage lambda est construit à partir d'un promoteur P_R dont la partie comprise entre le site HindII situé dans la région -35 et le site d'initiation de la transcription est remplacée par un fragment synthétique de séquence identique à la séquence naturelle du P_L .
 - 25 b) la séquence leader transcrite à partir du promoteur en question est longue de 23 bases suivies d'un codon ATG d'initiation de la traduction, elle comprend un site de liaison des ribosomes homologue à l'ARN 16S du ribosome sur 9 bases et situé 12 bases en amont de l'ATG.
 - 30 c) les séquences reconnues par les enzymes KpnI, NcoI et BamHI sont combinées en une séquence de longueur minimum qui est:



3. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que:

5 a) le promoteur P_L et le leader transcrit à partir de ce promoteur sont construits à partir du promoteur P_R du plasmide vecteur pCQV2 par remplacement d'un fragment HindII-BamHI de 56 paires de bases par un
 10 fragment de 60 paires de bases synthétisé sous forme de 4 oligodésoxyribonucléotides.

b) des bactéries hôtes E.coli sont transformées par le plasmide obtenu sous a), sélectionnées, et isolées par crible caractéristique et les vecteurs portés sont
 15 caractérisés par séquençage des régions relevantes.

4. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon les revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la séquence leader inventée est la suivante:

A T G T A C T A A G G A G G T T T T G G T A C C A T G	
↑	↑
20 initiation de la transcription	initiation de la traduction

5. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon les revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le plasmide vecteur obtenu est modifié par la délétion
 25 d'un fragment HindIII-HindIII de 125 paires de bases dans le gène *cl857*.

6. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon la revendication 5 caractérisé en ce que le plasmide vecteur obtenu est modifié par l'insertion
 30 immédiatement en aval du site d'initiation de la traduction, d'une séquence qui porte un maximum de sites de restriction uniques dans le plasmide sur une

distance minimum en vue de l'insertion et de l'excision d'un ADN hétérologue.

- 5 7. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon les revendications 5 et 6 caractérisé en ce que la séquence est insérée au site BamHI du plasmide et porte notamment les séquences de reconnaissance des enzymes SacII, BalI, SalI, XhoI, SacI et PvuII uniques dans le vecteur et répartis sur une distance de 34 paires de bases.
- 10 8. Procédé de préparation de plasmides vecteurs selon les revendications 5 à 7 caractérisé en ce que la séquence insérée est la suivante:

15

	<u>BamHI</u>	<u>SacII</u>	<u>BalI</u>	
	G A T C C C G C G G T G G C C A			
	<u>SalI</u>	<u>XhoI</u>	<u>SacI</u>	<u>PvuII</u>
	G T C G A C C T C G A G C T C A G			

9. Plasmides vecteurs capables de transformer un hôte bactérien Escherichia coli et d'y promouvoir et contrôler l'expression d'un ADN hétérologue, caractérisés en ce qu'ils sont obtenus selon les revendications 1 à 8.
- 20



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0186643

Numero de la demande

EP 85 87 0160

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
X, P	EP-A-0 138 437 (GENEX CORPORATION) * Pages 6-11 *	1, 9	C 12 N 15/00
X, P	WO-A-8 501 515 (SANDOZ AG) * Page 15, alinéa 2. *	1	
A	PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE USA, vol. 81, no. 3, février 1984, pages 669-673, Washington, US; M. COURTNEY et al.: "High-level production of biologically active human alpha1-antitrypsin in Escherichia coli" * Page 671 *	1	
A	EP-A-0 040 922 (BIOGEN N.V.) * Pages 40-44 *	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)
A	EP-A-0 099 084 (HOFFMANN-LA ROCHE & CO.) * Exemple 1 *	1	C 12 N C 12 P
A	NATURE, vol. 263, 28 octobre 1976, pages 744-748; K.J. MARIANS et al.: "Cloned synthetic lac operator DNA is biologically active" --- -/-		
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 06-02-1986	Examineur CUPIDO M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0186643

Numero de la demande

EP 85 87 0160

Page 2

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
A	GENE, vol. 3, 1978, pages 123-134, Elsevier/North-Holland Biomedical Press, Amsterdam, NL; C.P. BAHL et al.: "Cloned seventeen-nucleotide-long synthetic lactose operator is biologically active"		

A	JOURNAL OF THE MOLECULAR AND APPLIED GENETICS, vol. 2, no. 1, janvier 1983, pages 1-10, Raven Press, New York, US; C. QUEEN: "A vector that uses phage signals for efficient synthesis of proteins in Escherichia coli"		

A	NUCLEIC ACIDS RESEARCH, vol. 11, no. 3, 1983, pages 773-787, IRL Press Ltd., Oxford, GB; P.L. deHASETH et al.: "Chemical synthesis and biochemical reactivity of bacteriophage lambda PR promoter"		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl. 4)

Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 06-02-1986	Examineur CUPIDO M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		& : membre de la même famille, document correspondant	